



CHIRURGIES IMPLANTAIRES



CLINIQUE DENTAIRE
& D'IMPLANTOLOGIE
JEAN BERNARD

DIRECTIVES PRÉOPÉRATOIRES

SEMAINE PRÉCÉDANT LA CHIRURGIE

- Si vous êtes fumeur, rincer votre bouche avec de l'eau tiède salée 3 fois par jour au cours de la semaine précédant la chirurgie (1/2 c. à thé de sel dans un verre d'eau tiède).
- S'abstenir de prendre de l'acide acétylsalicylique (Aspirine) pendant les 10 jours précédant l'intervention.
- Veiller à ce qu'une personne responsable puisse vous accompagner le jour de la chirurgie, si un médicament causant de la somnolence a été pris.

DIRECTIVES POSTOPÉRATOIRES

IL N'EST AUCUNEMENT NÉCESSAIRE
D'ÊTRE À JEUN LE JOUR DE LA CHIRURGIE.
IL EST INDICQUÉ DE PORTER UN
VÊTEMENT CONFORTABLE.

LE JOUR DE LA CHIRURGIE ET LES 24 HEURES SUIVANTES

- Prendre vos médicaments tels que prescrits par votre dentiste. Apportez-les au rendez-vous.
- _____
- _____
- _____
- Ne pas toucher le site de l'intervention avec les doigts ou la langue.
- Il est normal que la salive soit teintée de sang pour environ une journée.
- Ne pas s'étendre ou ne pas dormir sans placer la tête sur un oreiller.
- Ne pas rincer la bouche pendant les premières 24 heures.
- Appliquer un sac de glace entouré d'une serviette humide au moins 10 minutes à toutes les heures.
- Restreindre votre alimentation à une diète molle (qui ne demande aucune mastication).
- Nettoyer le site opéré avec le rince-bouche prescrit (PERIOGARD) à l'aide d'un coton-tige 1 à 2 fois par jour (à l'exception du jour de la chirurgie).
- La douleur est normale quoique différente d'une personne à l'autre.
- **ÉVITER LE SURMÉNAGE**

LES JOURS SUIVANTS

- Après les repas, brosser délicatement les dents.
- **NE PAS FUMER !** La nicotine peut nuire à la guérison, il est donc préférable de s'abstenir.
- Rincer votre bouche 1 à 2 fois par jour avec Périogard ou utiliser un mélange composé de 1/2 c. à thé de sel dilué dans un verre d'eau tiède.
- Une enflure peut se produire et atteindre son maximum sur une période de 48 à 72 heures après la chirurgie. Elle disparaîtra dans les jours suivants.
- Éviter les liquides et repas chauds pour 1 semaine.
- Il est normal de voir l'apparition d'ecchymoses. Aucun traitement n'est indiqué et tout rentrera dans l'ordre à l'intérieur d'environ 2 semaines.
- N'effectuer aucune mastication au niveau du site chirurgical pour les prochains mois. Si vous avez une prothèse dentaire, ne la portez pas pour manger.
- Après environ 10 jours, un rendez-vous de contrôle sera tenu pour l'ablation des points de suture.
- Pour les porteurs de prothèse, une base molle sera appliquée après 2 semaines. Il est recommandé de porter votre prothèse le moins possible durant cette période. Cette base molle sera changée aux 3-4 semaines durant le temps de l'ostéointégration des implants.
- Un engourdissement de la lèvre inférieure, de la langue et du menton peut survenir suite à une intervention au maxillaire inférieur. Ce symptôme devrait disparaître au cours des semaines ou des mois qui suivront.

DIRECTIVES GÉNÉRALES

- Au moindre problème ou signe de complication, contacter la clinique immédiatement. Si un problème survient durant la fin de semaine, veuillez nous joindre au _____ en mentionnant votre nom et numéro de téléphone.
- Prendre vos médicaments tels que prescrits par votre dentiste (antibiotique et anti-inflammatoire).